

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области  
государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Самарской области  
«Борский государственный техникум»

**«Согласовано»**

Руководитель МК

\_\_\_\_\_ Н.С. Ромаева

«30» августа 2019 г.

Протокол № \_\_\_\_\_

от «30» августа 2019г.

**Утверждаю**

Зам. директора по УВР

\_\_\_\_\_ Е.М. Ковалева

«30» августа 2019г.

**Методические рекомендации по выполнению  
домашней контрольной работы  
для студентов заочного отделения**

по дисциплине **ЕН.01 Математика**

для специальности

**44.02.01 Дошкольное образование**

(гуманитарный профиль)

с. Борское, 2019 г.

## **Аннотация**

Пособие предназначено для оказания помощи студентам заочного отделения при выполнении домашней контрольной работы по математике или по элементам высшей математики. Пособие включает в себя некоторые разделы, имеющиеся в этих курсах.

Пособие может быть использовано студентами дневной формы обучения.

**Автор:** Ромаева Н.С., преподаватель математики

## **Содержание**

1. Основные понятия комплексных чисел
2. Элементы линейной алгебры
3. Основы дискретной математики
4. Элементы теории вероятностей.
5. Литература.

## 1. Комплексные числа. Алгебраическая форма комплексного числа.

Изучить по учебной литературе вопросы:

1. Определение комплексного числа в алгебраической форме.
2. Геометрическое изображение комплексного числа.
3. Тригонометрическая форма комплексного числа.
4. Выполнение арифметических действий над комплексными числами в алгебраической и тригонометрической формах.

Задача решения уравнений вида  $x^2 + b^2 = 0$ , послужила одним из поводов для расширения понятия числа.

Рассмотрим уравнение:

$$x^2 + 1 = 0$$

$$x^2 = -1$$

$$x = \sqrt{-1},$$

Обозначим  $i = \sqrt{-1}$  – мнимая единица

$$\sqrt{-4} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{-1} = 2i$$

$$\sqrt{-3} = i\sqrt{3}$$

$$i^2 = -1, \text{ тогда } i^3 = i^2 \cdot i = -i$$

$$i^{24} = (i^2)^{12} = (-1)^{12} = 1$$

$$i^{13} = (i^2)^6 \cdot i = (-1)^6 \cdot i = i$$

Добавив ко всем действительным числам числа мнимые, получим множество комплексных чисел  $K$ .

**Определение.** Числа вида  $Z = a + bi$ , (где  $a$  – действительная часть;  $b$  – мнимая часть;  $i$  – мнимая единица), называются *комплексными*.


Запись  $Z = a + bi$  называется алгебраической формой комплексного числа.

### Геометрическое изображение

Ось  $OX$  – действительная ось

Ось  $OY$  – мнимая ось

### Комплексная плоскость



$$Z = a + bi$$

*RealZ* =  $a$  – действительная часть

*ImaginaryZ* =  $b$  – мнимая часть

### Действия над комплексными числами в алгебраической форме.

1) Сумма (разность) комплексных чисел

$$Z_1 = a_1 \pm b_1 i; Z_2 = a_2 \pm b_2 i$$

$$Z_1 \pm Z_2 = (a_1 \pm a_2) + (b_1 \pm b_2) \cdot i$$

2) Произведение комплексных чисел

$$\begin{aligned} Z_1 \cdot Z_2 &= (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) = a_1 a_2 + a_1 b_2 i + b_1 a_2 i + b_1 b_2 = \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + b_1 a_2) \cdot i \end{aligned}$$

(учли, что  $i^2 = -1$ )

3) Деление комплексных чисел

Для того чтобы выполнить деление комплексных чисел, надо числитель и знаменатель умножить на комплексное число, сопряженное знаменателю:

$$\overline{Z_2} = a_2 - b_2 i$$

$$\begin{aligned} \frac{Z_1}{Z_2} &= \frac{(a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i) \cdot (a_2 - b_2 i)} = \frac{a_1 a_2 - a_1 b_2 i + b_1 a_2 i - b_1 b_2 i}{a_2^2 - (b_2 i)^2} = \\ &= \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + (b_1 a_2 - a_1 b_2) \cdot i}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \cdot i \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \cdot i$$

**Пример.**

$$\frac{2 + 3i}{4 - 5i} = \frac{(2 + 3i)(4 + 5i)}{(4 - 5i)(4 + 5i)} = \frac{8 + 10i + 12i + 15i^2}{16 + 25} = \frac{-7 + 22i}{41} = -\frac{7}{41} + \frac{22i}{41}.$$


### Примеры решения задач

1) Построить на координатной плоскости числа  $Z_1$ ,  $Z_2$ , где  $Z_1 = 3 - 2i$ ,  $Z_2 = -1 + i$ .

**Решение**

На координатной плоскости изобразим точки  $(3; -2)$ ,  $(-1; 1)$  и соединим их с началом

координат, получив векторы, конечными точками которых являются заданные точки.



- 2) Выполнить действия сложения, вычитания, умножения, деления над комплексными числами в алгебраической форме.

$$Z_1 = 3 + 4i, Z_2 = 2i^{18} - 5i^{15}$$

### Решение

Предварительно преобразуем второе число, используя значения степеней единицы.  $i^{18} = i^{16+2} = i^{16}i^2 = 1i^2 = -1$ ,  $i^{15} = i^{12+3} = i^{12}i^3 = i^3 = -i$ ,  $Z_2 = -2 + 5i$

Выполним действия над числами:

$$Z_1 + Z_2 = (3 + 4i) + (-2 + 5i) = 3 + 4i - 2 + 5i = (3 - 2) + (4i + 5i) = 1 + 9i$$

$$Z_1 - Z_2 = (3 + 4i) - (-2 + 5i) = 3 + 4i + 2 - 5i = (3 + 2) + (4i - 5i) = 5 - i$$

$$Z_1 \cdot Z_2 = (3 + 4i) \cdot (-2 + 5i) = -6 + 15i - 8i + 20i^2 = -6 + 7i - 20 = -26 + 7i$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3 + 4i}{-2 + 5i} = \frac{(3 + 4i)(-2 - 5i)}{(-2 + 5i)(-2 - 5i)} = \frac{-6 - 15i - 8i + 20}{(-2)^2 - (5i)^2} = \frac{14 - 23i}{29} = \frac{14}{29} - \frac{23}{29}i$$

- 3) Представить число в тригонометрической форме  $Z = -\sqrt{3} + i$

Найдем модуль и аргумент комплексного числа

Модуль  $r = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$ , для определения аргумента воспользуемся соотношениями  $\cos j = \frac{a}{r} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ;  $\sin j = \frac{b}{r} = \frac{1}{2}$ ; аргумент  $j$  найдем из условия  $-\pi < j \leq \pi$ , тогда  $j = \frac{5\pi}{6}$ .  $Z = 2 \left( \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$

## 2. Элементы линейной алгебры

Изучить по учебной литературе вопросы:

1. Матрицы, их виды.
2. Действия над матрицами.
3. Определитель матрицы. Вычисление определителей второго и третьего порядков.

4. Обратная матрица, ее определение и получение обратной матрицы второго и третьего порядков.  
 5. Решение матричных уравнений.  
 6. Решение системы линейных уравнений по формулам Крамера, в виде матричного уравнения.

### Примеры решения задач.

!. Выполнить действия над матрицами  $A = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix}$   $B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

Составить матрицу  $M = (2A - B)(B+E)$

#### Решение

Составим матрицу  $2A - B$ , для чего все элементы матрицы  $A$  умножим на 2, а затем из каждого элемента матрицы  $2A$  вычтем соответствующий элемент матрицы  $B$ .

$$2A - B = \begin{vmatrix} 4 & -6 & 2 \\ -2 & 4 & 2 \\ 8 & 2 & -6 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -8 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 7 & -2 & -7 \end{vmatrix}$$

Составим матрицу  $B+E$ , где матрица  $E$  является единичной матрицей третьего порядка:

$$B + E = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

Матрица  $M$  является произведением полученных матриц, то-есть каждый ее элемент равен сумме произведений соответствующих элементов строки матрицы  $2A-B$  и столбца матрицы  $B+E$

$$M = \begin{vmatrix} -8 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 7 & -2 & -7 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}^2$$

$$= \begin{matrix} 5 \times (-8) \times 2 + (-8) \times 1 \times 4 + 1 \times 0 \times 1 \\ 0 \times 0 \times 2 + 1 \times 0 \times 4 + 0 \times 1 \times 1 \\ 7 \times 0 \times 2 + (-2) \times 0 \times 4 + (-7) \times 1 \times 1 \end{matrix} \times \begin{matrix} 5 \times 2 + (-8) \times 2 + 1 \times 2 \\ 0 \times 2 + 1 \times 4 + 0 \times 4 \\ 7 \times 2 + (-2) \times 4 + (-7) \times 4 \end{matrix} \times \begin{matrix} 0 \times 2 + 1 \times 0 + 0 \times 2 \\ 0 \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times 2 \\ 7 \times 1 + (-2) \times 2 + (-7) \times 0 \end{matrix} \times \begin{matrix} 18 & -9 \\ 2 & 2 \\ -22 & -11 \end{matrix}$$

Вычислить определитель матрицы:

$$a) A = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -5 & -6 \end{vmatrix} \quad b) C = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$$

#### Решение

а) Для вычисления определителя второго порядка воспользуемся правилом, изложенным в учебной литературе:

$$DA = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -5 & -6 \end{vmatrix} = 3 \times (-6) - 4 \times (-5) = -18 + 20 = 2$$

б) Для вычисления определителя третьего порядка воспользуемся одним из правил, называемым разложением по элементам первой строки:

$$DC = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 1 & 4 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 3 \times \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} + (-5) \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = \\ = 3 \times (12 + 6) - 2 \times (3 - 10) + (-5) \times (-3 - 20) = 54 + 14 + 115 = 183$$

3. Найти обратную матрицу для матрицы второго порядка  $A = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}$

### Решение

Для получения обратной матрицы  $A^{-1}$  воспользуемся формулой  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times \tilde{A}$ , где

$\tilde{A}$  - союзная матрица, составленная из элементов заданной матрицы при помощи перемены мест элементов главной диагонали и изменения знаков элементов побочной диагонали.

$$\det A = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 28 - 15 = 13; \quad A^{-1} = \frac{1}{13} \times \begin{vmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{13} \times \begin{vmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{13} \times \begin{vmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 4 \end{vmatrix}$$

Для проверки можно найти произведение матриц  $A$  и  $A^{-1}$ ; должна получиться единичная матрица второго порядка.

4. Решить систему уравнений по формулам Крамера

$$\begin{cases} 3x + 5y - 4z = -25 \\ 2x - 3y + z = 17 \\ 5x + 4y - 2z = -10 \end{cases}$$

### Решение

Для решения задачи нужно вычислить четыре определителя третьего порядка:

- главный определитель, составленный из коэффициентов при неизвестных;
- дополнительный для  $x$ , полученный из главного определителя заменой чисел первого столбца на свободные члены;
- дополнительный для  $y$ , полученный из главного определителя заменой чисел второго столбца на свободные члены;
- дополнительный для  $z$ , полученный из главного определителя заменой чисел третьего столбца на свободные члены;

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -4 \\ 2 & -3 & 1 \\ 5 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 3(6 - 4) - 5(-4 - 5) + (-4)(8 + 15) = 6 + 45 - 92 = -41$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -25 & 5 & -4 \\ 17 & -3 & 1 \\ -10 & 4 & -2 \end{vmatrix} = (-25)(6 - 4) - 5(-34 + 10) + (-4)(68 - 30) = -50 + 120 - 152 = -82$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 3 & -25 & -4 \\ 2 & 17 & 1 \\ 5 & -10 & -2 \end{vmatrix} = 3(-34 + 10) + 25(-4 - 5) - 4(-20 - 85) = -72 - 225 + 420 = 123$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -25 \\ 2 & -3 & 17 \\ 5 & 4 & -10 \end{vmatrix} = 3(30 - 68) - 5(-20 - 85) - 25(8 + 15) = -114 + 525 - 575 = -164$$

Для получения значений неизвестных требуется разделить значения дополнительных определителей на главный определитель.

$$x = \frac{-82}{-41} = 2; \quad y = \frac{123}{-41} = -3; \quad z = \frac{-164}{-41} = 4$$

Ответ:  $x = 2; y = -3; z = 4$

Решение задачи можно проверить при помощи найденных значений в уравнения системы.

### 3. Дискретная математика

Изучить по учебной литературе вопросы:

- а. Множества, их виды, способы задания.
- б. Простейшие действия над множествами.
- с. Отношения, их некоторые виды.
- д. Графы, их основные элементы.
- е. Некоторые виды графов.

Упражнения и их решение.

- 1) Составить объединение, пересечение и разность двух множеств.

а)  $A = \{3; 4; 6; 7\}, B = \{2; 3; 4; 5\}$

$$A \dot{\cup} B = \{2; 3; 4; 5; 6; 7\}, A \cap B = \{3; 4\}, A \setminus B = \{6; 7\}$$

б)  $A = (-1; 3]; B = [1; 5]$

$$A \dot{\cup} B = (-1; 5]; A \cap B = [1; 3]; A \setminus B = (-1; 1)$$

В этом упражнении решение следует сопровождать рисунками.

### 4. Элементы теории вероятностей

Изучить по учебной литературе вопросы:

- а. Случайные события, их виды.
- б. Вероятность случайного события, способы ее получения.
- с. Комбинаторика. Применение элементов комбинаторики к вычислению вероятности.
- д. Действия над случайными событиями, вычисление вероятностей результатов действий.
- е. Случайные величины, их виды. Закон распределения случайной величины
- ф. Ряд и функция распределения дискретной случайной величины.
- г. Математическое ожидание дискретной случайной величины.
- х. Дисперсия дискретной случайной величины.

Примеры решения задач

- 1) Имеется набор разноцветных шариков, среди которых 5 синих, 3 красных и 2 зеленых. Наугад извлекают 4 шарика. Найти вероятность того, что среди извлеченных шариков 2 синих, 1 красный и 1 зеленый.

#### Решение

Для определения вероятности случайного события будем использовать классическую формулу  $P(A) = \frac{m}{n}$ , в которой  $n$  – число всех возможных исходов,  $m$  – число исходов, благоприятных появлению события. В задаче значения этих величин сле-

дует находить при помощи сочетаний.

$$n = C_{10}^4 = \frac{10!}{4!6!} = \frac{7 \times 8 \times 9 \times 10}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = 210 \quad m = C_5^2 \times C_3^1 \times C_2^1 = 10 \times 3 \times 2 = 60$$

$$P(A) = \frac{60}{210} = \frac{2}{7}$$

- 2) Из карточек разрезной азбуки составлено слово «панорама». Карточки перемешали и наудачу по одной извлекают 5 карточек, выкладывая их в порядке извлечения. Найти вероятность того, что окажется составленным слово «роман».

### Решение

В этой задаче можно воспользоваться произведением зависимых случайных событий

$A$  – получение слова «роман»;  $B_1$  – извлечение первой карточки с буквой «р»;  $B_2$  – извлечение второй карточки с буквой «о»; и т.д. Тогда  $A=B_1 \cdot B_2 \cdot B_3 \cdot B_4 \cdot B_5$

$$P(A)=P(B_1) \cdot P(B_2) \cdot P(B_3) \cdot P(B_4) \cdot P(B_5)=\frac{1}{8} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{6} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{4}=\frac{1}{2240}$$

- 3) В трех ящиках имеется по 6 одинаковых изделий, среди которых соответственно 2, 1, 3 бракованных. Наугад из каждого ящика извлекают по одному изделию. Найти вероятность того, что среди них окажутся два качественных и одно бракованное изделия.

### Решение

Для решения задачи рассмотрим события:  $A$  – извлечение двух качественных и одного бракованного изделия,  $B_1$  – извлечение качественного изделия из первого ящика;

$B_2$  – извлечение качественного изделия из второго ящика;  $B_3$  – извлечение качественного изделия из третьего ящика; извлечение бракованного изделия для каждого ящика является событиями  $\bar{B}_1, \bar{B}_2, \bar{B}_3$ . Составим событие  $A$  и вычислим его вероятность

$$A = B_1 \times B_2 \times \bar{B}_3 + B_1 \times \bar{B}_2 \times B_3 + \bar{B}_1 \times B_2 \times B_3$$

$$P(A)=\frac{4}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{6} + \frac{4}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{3}{6} + \frac{2}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{6}=\frac{92}{216}=\frac{23}{54}$$

## 5. Задания для выполнения контрольной работы

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области  
«Борский государственный техникум»

«Согласовано»

Руководитель МК

\_\_\_\_\_ Н.С. Ромаева

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2019 г.

Протокол № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_ 2019г.

Утверждаю

Зам. директора по УВР

\_\_\_\_\_ Е.М.

Ковалева

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2019г.

### ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной дисциплине ЕН.01 Математика Вариант 1

1. Дать определение: Подмножество – это....

2. Закончите определение: Множество, содержащее только те элементы, принадлежащие множеству А и не принадлежащие множеству В, называют ...

- а) пересечением множеств;
- б) объединением множеств;
- в) разностью множеств;
- г) объединенностью множеств.

3. Укажите верный вариант пересечения множеств:

$$A = \{1;2;3;4;5\} \text{ и } B = \{a;b;v;4;1\}$$

- а)  $A \cap B = \{1;2;3;b;a;v;4\};$
- б)  $A \cap B = \text{_____};$
- в)  $A \cap B = \{a; b; v\};$
- г)  $A \cap B = \{1;4\};$
- д) нет верного ответа;
- е) все ответы верны.

4. На схеме отражено участие девятиклассников в олимпиадах по математике (круг М), по литературе (круг Л) и по английскому языку (круг А).

а) Сколько девятиклассников участвовало в олимпиаде по математике?


б) Сколько учащихся участвовало в олимпиадах по математике и по английскому языку?

в) Сколько учащихся участвовало в олимпиадах по литературе и английскому языку?

г) Сколько учащихся участвовало в какой-нибудь одной из трёх олимпиад?

д) Сколько учащихся участвовало в каких-либо двух олимпиадах?

е) Сколько учащихся участвовало во всех трёх олимпиадах?



5. Даны комплексные числа:  $z_1 = 2 + i$ ,  $z_2 = 3i + 1$ . Вычислите:

a)  $Z_1 + Z_2$ ; б)  $Z_1 - Z_2$ ; в)  $Z_1 \cdot Z_2$

6. Вычислите:  $(3 + i)(3 - i) - (6 + 2i) + 7$ ;

7. Найти модуль комплексных чисел  $z_1, z_2$ , из задания 1.

8. Найти  $A + B^T$ , если  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ .

9. Даны матрицы  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -7 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ .

Найти: а)  $2A + 3B^T - C$ ; б)  $(A - B)^T + 2C$ .

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  
«Борский государственный техникум»

«Согласовано»

Руководитель МК

Н.С. Ромаева

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2019 г.

Протокол № \_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_ 2019г.

Утверждаю

Зам. директора по УВР

Е.М. Ковалева

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2019г.

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**для проведения промежуточной аттестации**  
**в форме дифференцированного зачета по учебной дисциплине**  
**ЕН.01 Математика**  
**Вариант 2**

1. Дать определение: Множество – это....

2. Закончите определение:

Множество, содержащее только те элементы, принадлежащие и множеству А и множеству В, называют ...


- а) пересечением множеств;
- б) объединением множеств;
- в) разностью множеств;
- г) объединенностью множеств.

3. Укажите верный вариант записи объединения множеств:

$$A = \{1;2;3;6\} \text{ и } B = \{a;b;v;4;1\}$$

- а)  $A \dot{\cup} B = \{1;2;3;6;a;b;v;4\};$
- б)  $A \dot{\cup} B = \{ \};$
- в)  $A \dot{\cup} B = \{a; b; v\};$
- г)  $A \dot{\cup} B = \{1;6\};$
- д) нет верного ответа;
- е) все варианты верны.

4. На схеме отражены результаты опроса учащихся 6 классов об их отношении к детективной литературе и фантастике. Прямоугольник отображает всех учащихся 6 класса, круг Д – множество учащихся, любящих детективы, круг Ф – шестиклассники, любящие фантастику.



Ответьте на вопросы:

- а) Сколько учеников не читают ни детективы, ни фантастику?
- б) Сколько шестиклассников любят детективы, но не читают фантастику?
- в) Сколько шестиклассников любят читать и детективы и фантастику?
- г) Сколько учащихся любят фантастику и не любят детективы?
- д) Сколько учащихся увлекается хотя бы одним из указанных видов литературы? е) Сколько учащихся всего было опрошено?

5. Даны комплексные числа:  $z_1 = 2 - 3i$ ,  $z_2 = i + 1$ . Вычислите:

$$\text{a) } z_1 + z_2 ; \quad \text{б) } z_1 - z_2 ; \quad \text{в) } z_1 \cdot z_2 ;$$

6. Вычислите:  $(2 - i)(2 + i) - (3 - 2i) + 7$ .

7. Найти модуль комплексных чисел  $z_1, z_2$  из задания 1.

8. Найти  $A + B^T$ , если  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

9. Даны матрицы  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 5 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -7 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ ,  $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

Найти: а)  $2A + 3B^T - C$ ; б)  $(A - B)^T + 2C$ .

## **6. Список используемой литературы.**

Основные источники:

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.И. Башмаков. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. ISBN 978-5-4468-2623-0

Дополнительные источники:

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с.
2. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 кл. – М., 2010
3. Гнеденко Б. В., Элементарное введение в теорию вероятностей М., «Наука», 1982.
4. Гусак А. А., Теория вероятностей, Минск ТетраСистемс, 2002.
5. Валуцэ И.И., Математика для техникумов, Москва «Наука», 1990
6. Григорьев В.П., Элементы высшей математики: Учебник. - М., «Академия», 2004.
7. Григорьев С.Г. Математика – М.: «Академия», 2005.